

中枢神経系

レジメン名	GBM BEV(15) 【初発】 単剤療法			投与日														更新日	2020/3/17	
				投与日														1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～	↓																
生理食塩液	100mL		90分	↓																

備考：

レジメン名	GBM BEV(10) 【再発】			投与日														更新日	2020/3/27	
				投与日														1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30～	↓																
生理食塩液	100mL		90分	↓																

備考：

レジメン名	GBM BEV(10) 【初発】 TMZ75/RT併用			投与日														更新日	2020/3/27	
				投与日														1クール	70日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	・	15	・	29	・	42	・	70								
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	100mL		30分	↓																
テモゾロミドカプセル	75mg/m ² /日	内服				day1～42														

備考：RT併用

中枢神経系

レジメン名	GBM BEV(10)【初発】維持TMZ150~200併用													更新日									
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓					↓														
アバステン点滴静注用生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓					↓														
テモゾロミドカプセル	150~200mg/m ² /日	内服		day1-5																			

備考：

レジメン名	CARB-VP													更新日									
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓	↓	↓																	
グラニセトロン点滴静注デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	中心静脈	30分	↓	↓	↓																	
エトポシド点滴静注液ブドウ糖液5%	150mg/m ² 500mL	中心静脈	2時間	↓	↓	↓																	
カルボプラチン注射液生理食塩液	450mg/m ² 500mL	中心静脈	2時間	↓																			
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン	×1	×2	×2	×1																
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓																	

備考：