

臍臓

レジメン名	FOLFIRINOX													更新日	2020/3/13				
														1クール	14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	20mL	中心静脈	フラッシュ	↓															
ブドウ糖液5%	100mL	中心静脈	メイン	↓															
アロキシ点滴静注 デキサート注射液 ポラミン注	0.75mg 9.9mg 5mg	中心静脈	30分	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	85mg/m ² 250mL	中心静脈	2時間	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5%	200mg/m ² 250mL	中心静脈	2時間	↓															
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 ブドウ糖液5%	180mg/m ² 250mL	中心静脈	90分	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	中心静脈	15分	↓															
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	2400mg/m ² 5,000単位 適宜調整	中心静脈	46時間	↓															

備考：アプレピタントカプセル（day1-3）、デキサメタゾン錠4mg/日（day2-3）

レジメン名	GEM+nab PTX													更新日	2020/3/26					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	125mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：

臍臓

レジメン名	GEM1000 3週1休													更新日	2020/3/26				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：