

胃

レジメン名	FOLFOX 6 胃癌（リザーバー）													更新日					
														1クール	2020/3/19 14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
ブドウ糖液5%	100mL	中心静脈	メイン	↓															
アロキシ点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg 6.6mg 5mg	中心静脈	15分	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5%	200mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	85mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50ml	中心静脈	15分	↓															
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	2400mg/m ² 5000単位 適宜調整	中心静脈	46時間	↓															

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

レジメン名	GC : NIVO (240mg/body)													更新日					
														1クール	2020/3/13 14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：

胃

レジメン名	GC : Her+XP併用療法													更新日	2020/3/19				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	.	.	.	15	.	21							
生理食塩液	500ml	点滴末梢	メイン	↓															
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓													
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500ml 8mEq	点滴末梢	1時間	↓															
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液 デキサート注射液	50ml 6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓													
ハーセプチン注射用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30分 ~45分)	↓															
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500ml	点滴末梢	2時間	↓															
ソルデム3A輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2													
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕~day15朝服用															

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回