



# 婦人科

レジメン名	BEV(3週毎)				更新日															
					1クール	2020/3/18	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	TC tri-weekly				更新日															
					1クール	2020/3/18	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	3時間	↓																
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>																			
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液	AUC=5																			
ブドウ糖液5%	250mL	内服	投与前	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg																			

備考：

# 婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+BEV				投与日															
					更新日		2020/3/18													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																
ブドウ糖液5%	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																
生理食塩液	100mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

レジメン名	Triweekly TN				投与日															
					更新日		2020/3/18													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																
ブドウ糖液5%	500mL																			
アクブラ静注用	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	TN+BEV				投与日														
					更新日	2020/3/18													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
ガスター注射液	20mg	点滴末梢																	
デキサート注射液	19.8mg																		
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓															
ブドウ糖液5%	500mL																		
アクブラ静注用	60mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	250mL																		
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：

レジメン名	GC+BEV				投与日														
					更新日	2020/3/18													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	8	.	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン			↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓													
デキサート注射液	6.6mg																		
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓		↓													
ブドウ糖液5%	100mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=4	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

# 婦人科

レジメン名	DC (75mg/m <sup>2</sup> )													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	DC+BEV													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：



# 婦人科

レジメン名	CPT-N													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	28											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓													
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													
アクブラ静注用 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓															
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													

備考：

レジメン名	CPT-CDDP 20mg/m2 day1.8.15													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											

備考：







# 婦人科

レジメン名	子宮肉腫GD													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 19.8mg	点滴末梢	30分			↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	900mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間			↓																

備考：2クール目以降ゲムシタビンの溶解液がブドウ糖液5% 250mL、投与時間が1時間30分の場合もあり

レジメン名	GC													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=4 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																		

備考：

# 婦人科

レジメン名	Gem単独													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	28												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓														

備考：

レジメン名	weekly CDDP40mg/m <sup>2</sup> (CCRT)													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																		
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																

備考：day2・3はデキサメタゾン内服



# 婦人科

レジメン名	AP													更新日	2020/3/18								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	・	21															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																			
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																			
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																			
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	×3	×2	×2																	
ソルデム3A輸液 ラシックス注	500mL 10mg	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																	

備考：

レジメン名	TP Tri-weekly+BEV													更新日	2020/3/18								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	・	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
アロキシ点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	0.75mg/50mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	15分	↓																			
パクリタキセル注 生理食塩液	135mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																			
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																			
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																			
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓																	
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																			

備考：

# 婦人科

レジメン名	卵巣癌・CPT11													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	28												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓														
グラニセトン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓														
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓		↓		↓														

備考：