

乳腺

レジメン名	MMK : AC(60, 600) (アロキシ使用)			更新日														
				1クール	2020/3/18 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓														
ドキシルピシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓														

備考：

レジメン名	MMK : TC(75, 600)			更新日														
				1クール	2020/3/18 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓														
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓														

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ddAC（ジーラスタ併用）（術後）				更新日	2020/3/18												
					1クール	14日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	14												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓														
ドキシルビシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓														

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

レジメン名	MMK：ddPTX（ジーラスタ併用）（術後）				更新日	2020/3/18												
					1クール	14日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	14												
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 16.5mg 20mg	点滴末梢	15分	↓														
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	175mg/m ² 250ml	点滴末梢	3時間	↓														
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓														

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+パ-ジェタ+ハ-セプチン				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
ハーセプチン注射用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	MMK：パ-ジェタ+ハ-セプチン				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																
ハーセプチン注射用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ハーセプチン				投与日														
					更新日		1クール												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ハーセプチン注射用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～45分)	↓															

備考：

レジメン名	MMK：パクリタキセル+パージェタ+ハーセプチン				投与日														
					更新日		1クール												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓															
ハーセプチン注射用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30～45分)	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名	MMK：パクリ（80）＋ハーセプチン			更新日															
				1クール	2020/3/17 7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓															
ハーセプチン注射用 生理食塩液	4mg/kg (2回目以降 2mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30～ 45分)	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：PAC（80）weekly			更新日															
				1クール	2020/3/17 7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名	MMK：W-PAC+BV療法													更新日	2020/3/17				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	90mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
アバチン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓				↓											
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：カドサイラ													更新日	2020/3/18				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
カドサイラ点滴静注用 生理食塩液	3.6mg/kg 250mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：アテゾリス`マブ`+ナブ`パ`クリタキセル										更新日	2020/3/19								
											1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
テセントリク点滴静注	840mg	点滴末梢	30~60分	↓				↓												
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL	点滴末梢				↓		↓												

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エリブリン			更新日															
				1クール	2020/3/18 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	21											
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓													
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4mg/m ² 50mL	点滴末梢	5分	↓		↓													

備考：

レジメン名	MMK：エリブリン（1投1休）			更新日															
				1クール	2020/3/18 14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4MG/m ² 50mL	点滴末梢	5分	↓															

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ナベルピン 2投1休											更新日	2020/3/17								
												1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
ナベルピン注	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓															
生理食塩液	50mL																				

備考：

レジメン名	MMK：ナベルピン 1投1休											更新日	2020/3/17								
												1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	14															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ナベルピン注	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓																	
生理食塩液	50mL																				

備考：

乳腺

レジメン名	MMK : CMF (内服)				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	14	・	28										
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m ² 50mL	点滴末梢	20分	↓		↓														
エンドキサン錠	100mg	内服		day1-14内服																

備考：

レジメン名	MMK : CMF (注射)				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	28												
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														

備考：