

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC CDDP+Pemetrexed+Pembro												更新日									
														2020/3/18									
														1クール									
														21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																	
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢		↓																			
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																			
アロキシ点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																					
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																
生理食塩液	50mL																						
アリムタ注射液	500MG/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																			
生理食塩液	50mL																						
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																			
シスプラチン点滴静注液	75mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
生理食塩液	500mL																						
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																		
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓																	

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名		NSCLC Pemetrexed+Pembro												更新日									
														2020/3/18									
														1クール									
														21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	21																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢																					
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																			
生理食塩液	50mL																						
アリムタ注射液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																			
生理食塩液	50mL																						

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC CBDCA+nab PTX+Pembro												更新日		2020/3/18			
														1クール		21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓											
生理食塩液	50mL																		
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		

備考：

レジメン名		NSCLC Pembro												更新日		2020/3/13			
														1クール		21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed													更新日									
														1クール	2020/3/18 21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																					
アリムタ注射液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																			
生理食塩液	50mL																						
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250mL																						

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed													更新日									
														1クール	2020/3/18 21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																	
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																			
硫酸Mg補正液	8mEq																						
アロキシ点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	9.9mg																						
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																
生理食塩液	50mL																						
アリムタ注射液	500MG/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																			
生理食塩液	50mL																						
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																			
シスプラチン点滴静注	75mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
生理食塩液	500mL																						
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																		
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓																	

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC BEV													更新日	2020/3/18					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+DTX													更新日	2020/3/18								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																			
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	60mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			

備考：

レジメン名	NSCLC CDDP+DTX (RT併用)													更新日	2020/3/18												
														1クール	28日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																							
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																					
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																				
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																							
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																							
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																				
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	40MG/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																							
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																							
シスプラチン点滴静注 生理食塩液	40mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																							
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																						
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓																					

備考：2コースまで。ドセタキセル；ショックに注意。CCRT後、ICI維持を行う場合、インターバル短縮の可能性有り。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+S-1													更新日							
														2020/3/18							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	14	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																	
S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1~14服用																	

備考：

レジメン名	NSCLC CDDP+S-1													更新日							
														2020/3/18							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	9	10	11	・	21	・	35								
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン			↓															
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン				↓	↓													
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン						↓												
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間			↓															
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分			↓															
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴末梢	15分				↓	↓	↓												
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分			↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間			↓															
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間			×2	↓														
S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1~21服用																	
アプレピタントカプセル		内服	指示通り			↓	↓	↓													

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC BEV+Erl													更新日	2020/3/18						
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服																

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC DTX													更新日							
														1クール		2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																	

備考：

レジメン名	NSCLC GEM													更新日							
														1クール		2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓															
ゲムシタビン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓															

備考：

レジメン名	NSCLC VNR													更新日							
														1クール		2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
ナベルビン注 生理食塩液	25mg/m ² 50mL	点滴末梢	全開	↓		↓															

備考：

