

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DLd-1										更新日								
											1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ソル・コーテブ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り			↓		↓		↓									
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。  
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DLd-2										更新日								
											1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。  
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-3~6											更新日	2020/3/25							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	.	15	.	.	.	22	.	28								
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓													
レブラミドカプセル		~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。  
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-7~											更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	.	.	.	.	.	22	.	28								
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
レブラミドカプセル		~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。  
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DBd-1											更新日	2020/3/18				
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日											1クール	21日間	
					1	4	8	11	15	21								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓								
ソル・コーテブ注射用	300mg	点滴末梢	15分	↓			↓			↓								
生理食塩液	50mL	点滴末梢		↓														
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓														
生理食塩液	1L	点滴末梢																
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り				↓			↓								
生理食塩液	500mL	点滴末梢																
ベルケイド注射用	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		↓		↓		↓		↓								
生理食塩液	20mL																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DBd-2~3											更新日	2020/3/18				
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日											1クール	21日間	
					1	4	8	11	15	21								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓								
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓								
生理食塩液	500mL	点滴末梢		↓														
ベルケイド注射用	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		↓		↓		↓		↓								
生理食塩液	20mL																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-4~8												更新日	2020/3/18							
													1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	4	8	11	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																	
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m <sup>2</sup> 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-9~				更新日														
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓															
生理食塩液	500mL																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日と翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-1				更新日														
					1クール	42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓					↓		↓				↓				↓
ソル・コーテフ注射用	300mg	点滴末梢	15分	↓				↓											
生理食塩液	50mL																		
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓															
生理食塩液	1L																		
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り					↓			↓	↓			↓				↓
生理食塩液	500mL																		
ベルケイド注射用	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	—	↓		↓		↓			↓		↓		↓			↓	
生理食塩液	20mL																		
アルケラン錠	9mg/m <sup>2</sup>	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m <sup>2</sup>	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM Dara-BMP-2~9											更新日	2020/3/18									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
					1	4	8	22	29	42													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓				↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓				↓															
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m <sup>2</sup> 20mL	皮下注射		↓			↓	↓	↓														
アルケラン錠	9mg/m <sup>2</sup>	内服		day1~4																			
プレドニン錠	60mg/m <sup>2</sup>	内服		day2~4																			

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM Dara-BMP-★10~											更新日	2020/3/26								
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	28																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM EPd-1							更新日	2020/3/26										
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢		↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
注射用水	40mL	点滴末梢		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	250mL																			
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名		MM EPd-2							更新日	2020/3/26										
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢		↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
注射用水	40mL	点滴末梢		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	250mL																			
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-3~										更新日																					
											2020/3/26																					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																												
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																												
生理食塩液	50mL	点滴末梢																														
エムブリシティ点滴静注用	20mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓																												
注射用水	60mL	点滴末梢																														
生理食塩液	250mL																															
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																												

備考：エムブリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注射と、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	Carfilzomib- 1										更新日																				
											2020/3/31																				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																										
カイプロリス点滴静注用	20mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢																													
注射用水	40mL	点滴末梢	10分	↓	↓																										
ブドウ糖液5%	100mL																														
カイプロリス点滴静注用	27mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	10分																												
注射用水	40mL																														
ブドウ糖液5%	100mL																														
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																											

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用



# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		Carfilzomib- 2~12												更新日	2020/3/31				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	8	9	15	16	21	28								
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注用 注射用水	27mg/m <sup>2</sup> 40mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
ブドウ糖液 5%	100mL																		
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用

レジメン名		Carfilzomib-13~												更新日	2020/3/31				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	15	16	21	28										
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	27mg/m <sup>2</sup> 40mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液 5%	100mL																		
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用

レジメン名		MM ELd-1 (Elotuzumab-1)												更新日	2020/3/26				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓							
ソル・コーテブ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
エムプリシティ点滴静注用 注射用水	10mg/kg 40mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
生理食塩液	250mL																		
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM ELd-2 (Elotuzumab-2)											更新日	2020/3/26							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
ソル・コーテブ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																	

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名		MM ELd-3~ (Elotuzumab-3~)											更新日	2020/3/26							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	15	21	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
ソル・コーテブ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓															
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓															
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																	

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

# 多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	高用量Carfilzomib- 1													更新日	2020/3/31							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	20mg/m <sup>2</sup> 40mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
ブドウ糖液 5%	100mL																					
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m <sup>2</sup> 60mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液 5%	100mL																					

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

レジメン名	高用量Carfilzomib- 2～													更新日	2020/3/31							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m <sup>2</sup> 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液 5%	100mL																					

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用