

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名	AML 地固め 1 (MA)													更新日	2020/3/17								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	.	28												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓																	
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓															
ノバントロン注 生理食塩液	7mg/m ² 100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓																	
ソルデム 3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×4	×4	×4	×4	×4	×4	×1													

備考：

レジメン名	AML 地固め 2 (DA)													更新日	2020/3/30								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	.	21												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓																	
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓															
ダウノマイシン静注用 生理食塩液	50mg/m ² 100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓																	
ソルデム 3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×4	×4	×4	×4	×4	×4	×1													

備考：

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名	AML 地固め3(AA)													更新日	2020/3/30									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	・	21													
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓	↓																
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																
アクラシノン注射用 生理食塩液	20mg/m ² 100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン	×4	×4	×4	×4	×4	×1															
メソトレキセート キロサイド注 プレドニン 生理食塩液	15mg 40mg 10mg 2mL	髄注	—	↓																				

備考：

レジメン名	AML 地固め4(A triple V)													更新日	2020/3/30									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	・	8	・	10	・	21										
生理食塩液	500mL	中心静脈	メイン	↓	↓	↓	↓	↓																
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓	↓																
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン	↓	↓	↓	↓	↓																
生理食塩液	100mL	静脈注射	メイン								↓		↓											
オンコビン注射用 生理食塩液	0.8mg/m ² 20mL	静脈注射	ワンショット								↓													
フィルデシン 生理食塩液	2mg/m ² 20mL	静脈注射	ワンショット										↓											

備考：

