

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	CHOP													更新日	2020/3/13							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	21												
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓																		
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																		
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																		
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓																		
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														

備考：

レジメン名	リツキシマブ+CHOP療法													更新日	2020/3/25							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液	375mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																		
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン		↓																	
グラニセトロン点滴静注 プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分		↓																	
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																	
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																	
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間		↓																	
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後			↓	↓	↓	↓													

備考：

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G単剤			更新日	2020/3/25																
				1クール	56日間																
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	56															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分	↓																	
生理食塩液	50mL																				
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																	
生理食塩液	250mL																				
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																	

備考:

レジメン名	G-CHOP療法1			更新日	2020/3/25																	
				1クール	21日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	8	・	15	・	21								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓								↓		↓								
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓								↓		↓								
生理食塩液	50mL																					
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓								↓		↓								
生理食塩液	250mL																					
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
ドキシソルビン塩酸塩注射用	50mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL																					
オンコピン注射用	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL																					
注射用エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	250mL																					
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時									↓		↓								
ポララミン錠	2mg 1錠			↓																		

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G-CHOP療法2~8												更新日	2020/3/25										
													1クール	21日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																				
プレドニン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓																				
ガザイバ点滴静注 生理食塩液	1000mg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																				
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																				
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																				
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓																				
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓																
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																				

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G-CVP療法1													更新日	2020/3/25							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	8	15	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓		↓										
プレドニン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓						↓		↓										
ガザイバ点滴静注 生理食塩液	1000mg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓						↓		↓										
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワソット	↓																		
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓																		
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														
カロナール錠 ポララミン錠	500mg 2錠 2mg 1錠	内服	治療時	↓						↓		↓										

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	G-CVP療法2~8													更新日	2020/3/25							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
プレドニン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓																		
ガザイバ点滴静注 生理食塩液	1000mg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワソット	↓																		
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓																		
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																		

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GB療法1													更新日	2020/3/25					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓		↓											
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓			↓		↓											
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓											
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
トリアキシン点滴静注用	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓	↓															
注射用水	100mL																			
生理食塩液	250mL																			
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓			↓		↓											
ポララミン錠	2mg 1錠																			

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	GB療法2~6													更新日	2020/3/25					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓															
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
トリアキシン点滴静注用	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓	↓															
注射用水	100mL																			
生理食塩液	250mL																			
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		PTCL : Pralatrexate療法											更新日	2020/3/25														
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
					1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	49											
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓													
ジフォルタ注射液 生理食塩液		30mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	全開投与	↓		↓		↓		↓		↓		↓													

備考：ジフォルタ投与10日以上前よりフォリアミン0.25T/日を内服。10日以上前よりビタミンB12 1mgの筋注、8~10週ごとに投与。

レジメン名		PTCL : Bv-CHP療法											更新日	2020/3/25														
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
					1	2	3	4	5	・	21																	
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓																							
グラニセトロン点滴静注 プレドニン		3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓																							
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液		50mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																							
注射用エンドキサン 生理食塩液		750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓																							
アドセトリス点滴静注用 注射用水 生理食塩液		1.8mg/kg 40mL 100or250mL	点滴末梢	30分 or1時間	↓																							
プレドニン錠		100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓																			

備考：アドセトリス初回投与前にinfusion reaction対策としてポララミン注+ソルコーテフ注投与

# 非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PCNSL : HD-MTX(3.5)													更新日	2020/3/26							
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	14												
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	×6	×6	×6	×6	×6														
グラニセトロン点滴静注液 リノロサル注射液	3mg/100mL 4mg	点滴末梢	30分	↓																		
メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液	3500mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	4時間	↓																		
ロイコボリン注	30mg	点滴末梢	ワンショット		×3	×4	×4	×2														

備考：メソトレキセート投与前にダイフェン錠の中止を確認

レジメン名	DeVIC療法													更新日	2020/3/30							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注液	33mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	300mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
注射用イホマイド 生理食塩液	1.5g/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 10mL	点滴末梢	メイン	↓	×2	×2																

備考：