胚細胞腫瘍

レジメン名	BEP																						更新日	2020/3/13
																							1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	・	9	・	16	・	21										
ラクテック★Ｄ輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓		↓		↓												
アロキシ点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓																		
グラニセトロン点滴静注液 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分				↓	↓																
ブレオ注射用 生理食塩液	30mg/body 100mL	点滴末梢	30分		↓					↓		↓												
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液５％	100mg/㎡ 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/㎡ 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																
ラクテック★Ｄ輸液	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	×2	×2	×2																

備考：

胚細胞腫瘍

レジメン名	絨毛癌　EMA/CO																							更新日	2020/3/13
																								1クール	14日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	3	・	8	・	14															
ソルデム３Ａ輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓			↓																	
グラニセトロン点滴静注液 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓	↓			↓																	
オンコビン注射用 生理食塩液	0.8mg/㎡ 50mL	点滴末梢	全開					↓																	
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/㎡ 250mL	点滴末梢	30分					↓																	
コスメゲン静注用 生理食塩液 注射用水	0.5mg/body 50mL 20mL	点滴末梢	全開	↓	↓																				
エトポシド点滴静注液 生理食塩液	100mg/㎡ 250mg	点滴末梢	1時間	↓	↓																				
メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液	300mg/㎡ 1L	点滴末梢	12時間	↓																					
ロイコボリン注	15mg/body	筋肉注射			↓	↓																			
ロイコボリン注	15mg/body	筋肉注射			↓	↓																			

備考：メソトレキセート終了12時間後よりロイコボリンを12時間毎に計4回投与