

# 中枢神経系

レジメン名	GBM BEV(15) 【初発】 単剤療法				更新日		投与日															
					1クール	2020/3/17	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	1	.	21																
アバステン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~ 90分	↓																		

備考：

レジメン名	GBM BEV(10) 【再発】				更新日		投与日															
					1クール	2020/3/27	14日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	1	.	14																
アバステン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	30~ 90分	↓																		

備考：

レジメン名	GBM BEV(10) 【初発】 TMZ75/RT併用				更新日		投与日															
					1クール	2020/3/27	70日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	1	.	15	.	29	.	42	.	70										
アバステン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																		
テモゾロミドカプセル	75mg/m <sup>2</sup> /日	内服	day1~42																			

備考：RT併用

# 中枢神経系

レジメン名	GBM BEV(10) 【初発】 維持TMZ150～200併用													更新日						
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	5	15	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓				↓												
アバステン点滴静注用生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	30～ 90分	↓				↓												
テモゾロミドカプセル	150～200 mg/m <sup>2</sup> /日	内服		day1-5																

備考：

レジメン名	CARB-VP													更新日						
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	28												
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓	↓	↓														
グラニセトロン点滴静注デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	中心静脈	30分	↓	↓	↓														
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	150mg/m <sup>2</sup> 500mL	中心静脈	2時間	↓	↓	↓														
カルボプラチン注射液 生理食塩液	450mg/m <sup>2</sup> 500mL	中心静脈	2時間	↓																
ソルデム3 A輸液	500mL	中心静脈	メイン	×1	×2	×2	×1													
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓														

備考：

# 中枢神経系

レジメン名	TMZ静注 放射線併用療法										更新日										
											2024/4/8										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	.....	42												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	連日投与	↓												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓		↓												
テモダール点滴静注用	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間 30分	↓	↓	↓	↓		↓												
大塚蒸留水 生理食塩液	1瓶 250mL			↓	↓	↓	↓		↓												

備考：放射線の中断により放射線治療期間が延長した場合は最大49日まで投与延長可能。

レジメン名	BEV (10) TMZ静注 放射線併用療法										更新日											
											2024/4/8											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.....	15	.....	29	.....	43												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	連日投与	↓	連日投与	↓	連日投与	↓												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓		↓												
テモダール点滴静注用	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓		↓		↓												
大塚蒸留水 生理食塩液	1瓶 250mL			↓		↓		↓		↓												
アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30~ 90分	↓			↓			↓												
生理食塩液	100mL			↓	↓	↓	↓															

備考：放射線の中断により放射線治療期間が延長した場合は最大49日まで投与延長可能。