

乳腺

レジメン名	MMK : AC(60, 600)				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ドキシルピシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：アプレピタントカプセル (day1-3)

レジメン名	MMK : AC(60, 600) (アロカリス)				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシルピシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ddAC（ジーラスタ併用）				更新日		2022/9/27													
					1クール		14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ドキシソルビシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注、アプレピタントカプセル（day1-3）

レジメン名	MMK：ddAC（ジーラスタ併用・アロカリス使用）				更新日		2022/9/27													
					1クール		14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシソルビシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

乳腺

レジメン名	MMK : TC(75, 600)				更新日		2020/3/18													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考 :

レジメン名	MMK : ddPTX (ジーラスタ併用) (術後)				更新日		2020/3/18													
					1クール		14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 16.5mg 20mg	点滴末梢	15分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	175mg/m ² 250ml	点滴末梢	3時間	↓																
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓																

備考 : day2~4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

乳腺

レジメン名	MMK : PTX+weeklyCBDCA+Pembro				更新日																
					1クール		21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓													
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
デキサート注射液	6.6mg					↓															
ガスター注射液	20mg					↓															
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	60分	↓																	
生理食塩液	250mL					↓															
カルボプラチン注射液	AUC=1.5	点滴末梢	60分	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL					↓															
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：

乳腺

レジメン名	MMK : PTX+CBDCA+Pembro (1回目) (アロカリス)			更新日	2023/10/16															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 20mg	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 6.6mg 20mg	点滴末梢	15分			↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 3.3mg 20mg	点滴末梢	15分					↓												
パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	60分	↓																
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

乳腺

レジメン名	MMK : PTX+CBDCA+Pembro (2回目以降) (アロカリス)			更新日	2023/10/16															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 20mg	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 1.65mg 20mg	点滴末梢	15分			↓		↓												
パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	60分	↓		↓		↓												
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	60分	↓																
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+パ-ジェタ+トラスツズマブ				更新日																
					1クール	2021/11/24 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
パ-ジェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																	
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																	
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																	

備考：

レジメン名	MMK：パ-ジェタ+トラスツズマブ				更新日																
					1クール	2021/11/24 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パ-ジェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																	
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																	

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：トラスツズマブ													更新日	2021/11/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30~45分)	↓																

備考：

レジメン名	MMK：パクリタキセル+パージェタ+トラスツズマブ													更新日	2021/11/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	21										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降30分)	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30~45分)	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名	MMK：パクリ（80）＋トラスツズマブ			更新日	2021/11/24														
				1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓															
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	4mg/kg (2回目以降 2mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~45分)	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：PAC（80）weekly			更新日	2020/3/17														
				1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓															

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

乳腺

レジメン名	MMK：W-PAC+BV療法													更新日										
														2020/3/17										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	・	8	・	15	・	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓																
ガスター注射液	20mg																							
デキサート注射液	備考参照																							
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓																
ブドウ糖液5%	250mL																							
アバチン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓				↓																
生理食塩液	100mL																							
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓																

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：カドサイラ													更新日									
														2020/3/18									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	21																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
カドサイラ点滴静注用	3.6mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																			
生理食塩液	250mL																						

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：アテゾリス [®] マブ [®] +ナブ [®] パクリタキセル													更新日	2020/3/19				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
テセントリク点滴静注 生理食塩液	840mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓				↓											
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エリブリン				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4mg/m ² 50mL	点滴末梢	5分	↓		↓														

備考：

レジメン名	MMK：エリブリン（1投1休）				更新日															
					1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4MG/m ² 50mL	点滴末梢	5分	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ビノレルビン 2投1休				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
ロゼウス静注液	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	MMK：ビノレルビン 1投1休				更新日															
					1クール		14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
ロゼウス静注液	25MG/m ²	点滴末梢	全開	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

乳腺

レジメン名	MMK : CMF (内服)				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	14	28													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m ² 50mL	点滴末梢	20分	↓		↓														
エンドキサン錠	100mg	内服		day1-14内服																

備考：

レジメン名	MMK : CMF (注射)				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	14	28													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：エンハーツ（アロカリス使用）				更新日																
					1クール	2023/10/12	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																	
エンハーツ点滴静注 注射用水（溶解用） ブドウ糖液5%	5.4mg/kg 100mL	点滴末梢	初回：90分 2回目以降： 30分	↓																	

備考：

レジメン名	MMK CBDCA＋GEM＋Pembro				更新日																
					1クール	2021/11/24	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓															
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=2 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓															

備考：

乳腺

レジメン名	MMK nab PTX+Pembro													更新日							
														2021/11/24							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓										↓						↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓		↓							↓		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓											↓
生理食塩液	100mL													↓							
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓
生理食塩液	100mL																			↓	↓

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				71	・	84																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																			
生理食塩液	100mL																					
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (1回目)													更新日						
														2021/11/24						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	1クール	84日間					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓			↓		↓				↓		↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン					↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓					↓										↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分										↓							
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
ガスター注射液	20mg							↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																	
デキサート注射液	3.3mg							↓												
ガスター注射液	20mg																			
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																	
デキサート注射液	1.65mg									↓		↓		↓					↓	↓
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓			↓		↓					↓	↓	
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓			↓		↓					↓	↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				71	84															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分																	
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	1.65mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (2回目以降)													更新日							
														2021/11/24							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓				↓		↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン						↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓					↓												↓
生理食塩液	100mL																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓
デキサート注射液	1.65mg																				
ガスター注射液	20mg																				
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				71	78	85	92	99	106	113	120	127	134	141	148	155	162				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																		
生理食塩液	100mL																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
デキサート注射液	1.65mg																				
ガスター注射液	20mg																				
パクリタキセル注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：（1回目）フェスゴ													更新日	2024/4/9							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上かけて	1	.	21																
				↓																		

備考：

レジメン名	MMK：（2回目以降）フェスゴ													更新日	2024/4/9							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上かけて	1	.	21																
				↓																		

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+（1回目）フェスゴ													更新日						
														1クール		2024/4/8 21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	MMK：ドセタキセル+（2回目以降）フェスゴ													更新日						
														1クール		2024/4/8 21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

乳腺

レジメン名	MMK：パクリタキセル+（1回目）フェスゴ				更新日		2024/4/8														
					1クール		21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	21											
フェスゴ配合皮下注IN	15mL	皮下注射	8分以上	↓																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓													
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	備考参照																				
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：パクリタキセル+（2回目以降）フェスゴ				更新日		2024/4/8														
					1クール		21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	21											
フェスゴ配合皮下注MA	10mL	皮下注射	5分以上	↓																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓													
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	1.65mg																				
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：