

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	CHOP				更新日		2024/7/24																	
					1クール		21日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注 ◆プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓																				
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																				
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																				
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓																				
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓																

備考：

レジメン名	リツキシマブ+CHOP療法				更新日		2024/7/24																	
					1クール		21日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																				
リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																				
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン		↓																			
グラニセトロン点滴静注 ◆プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分		↓																			
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																			
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																			
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間		↓																			
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後			↓	↓	↓	↓															

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Pola-R-CHP療法				更新日	2024/7/24																																		
					1クール	21日間																																		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																																				
				1	2	3	4	5	· 21																															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																																				
◆プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓																																				
生理食塩液	50mL	点滴末梢	ワンショット	↓																																				
ポララミン注	5mg/mL	点滴末梢	指示通り	↓																																				
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	初回90分、以降30分まで短縮可能	↓																																				
生理食塩液	500mL	点滴末梢	30分	↓																																				
ポライビー点滴静注用注射用水	1.8mg/kg	点滴末梢	ワンショット	↓																																				
生理食塩液	20mL	点滴末梢	2時間	↓																																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	朝食後	↓																																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢		↓																																				
ドキシルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢		↓																																				
生理食塩液	20mL	点滴末梢		↓																																				
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢		↓																																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢		↓																																				
◆プレドニン錠	100mg	内服		↓	↓	↓	↓	↓																																

備考：6コース終了後、リツキシマブ単剤2回投与（計8回） ポライビー投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛剤の前投薬を考慮

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G単剤				更新日	2020/3/25																	
					1クール	56日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	56																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分	↓																			
生理食塩液	50mL																						
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																			
生理食塩液	250mL																						
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																			

備考:

レジメン名	G-CHOP療法1				更新日	2024/7/24																				
					1クール	21日間																				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	2	3	4	5	.	8	.	15	.	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓							↓		↓													
◆プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓							↓		↓													
生理食塩液	50mL										↓		↓													
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓							↓		↓													
生理食塩液	250mL										↓		↓													
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																						
ドキソルビシン塩酸塩注射液	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																						
生理食塩液	20mL																									
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																						
生理食塩液	20mL																									
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																						
生理食塩液	250mL																									
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓																		
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓							↓		↓													
ポララミン錠	2mg 1錠										↓		↓													

備考: 前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G-CHOP療法2~8				更新日		2024/7/24															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
◆プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢																				
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL	点滴末梢																				
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL	点滴末梢																				
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																		

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		G-CVP療法1												更新日	2024/7/24							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	3	4	5	・	8	・	15	・	21							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓							↓		↓									
◆プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓							↓		↓									
生理食塩液	50mL	点滴末梢																				
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓							↓		↓									
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL	点滴末梢																				
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓		↓		↓													
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓							↓		↓									
ポララミン錠	2mg 1錠																					

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名		G-CVP療法2～8												更新日	2024/7/24							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	3	4	5	・	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
◆プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢																				
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL	点滴末梢																				
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓		↓		↓													
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																		

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Bendamustine療法													更新日	2022/5/19							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																	
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢																				
トリアキシン点滴静注液	120mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																	
生理食塩液	250mL																					

備考：

レジメン名	Bendamustine-R療法													更新日	2022/5/19							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																	
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓																		
ポララミン注	5mg	点滴末梢																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																					
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分		↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢																				
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																	
生理食塩液	250mL																					
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																		
生理食塩液	500mL																					

備考：ST合剤とアシクロピルの使用。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GB療法1				投与日														更新日	2020/3/25							
																			1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	2	・	8	・	15	・	28																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓		↓																		
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓			↓		↓																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓			↓		↓																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																						
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓																						
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓			↓		↓																		
ポララミン錠	2mg 1錠			↓																							

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	GB療法2~6				投与日														更新日	2020/3/25							
																			1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	2	・	28																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																						
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓																							
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓																							
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓																							
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																						
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓																						
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																							

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Pola-BR療法1													更新日	2021/6/15									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	・	21																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																		
ポララミン注 ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	5mg 100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓																			
リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																				
ポライビー点滴静注用 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 20mL 100mL	点滴末梢	90分		↓																			
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注	3.3mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分		↓	↓																		
トレアキシシン点滴静注液 生理食塩液	90mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間		↓	↓																		

備考：ST合剤とアシクロピルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

レジメン名	Pola-BR療法2～6													更新日	2021/6/15									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	・	21																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																			
リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																				
ポライビー点滴静注用 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 20mL 100mL	点滴末梢	30分	↓																				
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注	3.3mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																			
トレアキシシン点滴静注液 生理食塩液	90mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓																			

備考：ST合剤とアシクロピルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PTCL : Pralatrexate療法													更新日	2020/3/25							
														1クール	49日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	22	29	36	49												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
ジフォルタ注射液	30mg/m ²	点滴末梢	全開投与	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
生理食塩液	50mL																					

備考：ジフォルタ投与10日以上前よりフォリアミン0.25T/日を内服。10日以上前よりビタミンB12 1mgの筋注、8~10週ごとに投与。

レジメン名	PTCL : Bv-CHP療法													更新日	2024/7/24							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
◆プレドニン	100mg																					
ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																		
生理食塩液	20mL																					
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	250mL																					
アドセトリス点滴静注用	1.8mg/kg	点滴末梢	30分	↓																		
注射用水	40mL		or1時間																			
生理食塩液	100or250mL																					
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														

備考：アドセトリス初回投与前にinfusion reaction対策としてポララミン注+ソルコーテフ注投与

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Denileukin Diftitox-1~8													更新日	2021/11/9								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	.	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓															
生理食塩液 デキサート注射液	100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓															
レミトロ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	9μg/kg 20mL 100mL	点滴末梢	1時間	↓	↓	↓	↓	↓															
カロナール錠 ポララミン錠	500mg 1錠 2mg 1錠	内服	治療時	↓	↓	↓	↓	↓															

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PCNSL : HD-MTX(3.5)													更新日	2020/3/26							
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	14												
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	×6	×6	×6	×6	×6														
グラニセトロン点滴静注液 リノロサル注射液	3mg/100mL 4mg	点滴末梢	30分	↓																		
メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液	3500mg/m ² 500mL	点滴末梢	4時間	↓																		
ロイコボリン注	30mg	点滴末梢	ワンショット		×3	×4	×4	×2														

備考：メソトレキセート投与前にダイフェン錠の中止を確認

レジメン名	DeVIC療法													更新日	2020/3/30							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注液	33mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	300mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
注射用イホマイド 生理食塩液	1.5g/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 10mL	点滴末梢	メイン	↓	×2	×2																

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GCD療法													更新日	2023/2/21							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	・	8	・	21											
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓												
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓						↓												
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓						↓												
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
デカドロン錠	40mg	内服	朝食後	↓	↓	↓	↓															

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	m-AuTo BuTT療法(65歳以上75歳未満)													更新日	2020/10/1			
														1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	2	3	4	5	6	7	28		
ソルデム 3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×3	×3	×3	×3	×2	×2	×2								
生理食塩液	500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓			↓								
デキサート注射液	3.3mg	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓											
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL																	
ブスルフェクス点滴静注	3.2mg/kg	中心静脈	3時間	↓	↓													
生理食塩液	5.4mL/kg																	
リサイオ点滴静注液	5mg/kg	中心静脈	2時間			↓	↓											
生理食塩液	250mL																	
幹細胞輸注										↓								
アプレピタントカプセル	初回125mg 2回目以降80mg	内服	治療時	↓	↓	↓	↓											
ビクロックス錠	200mg 4錠	内服	分2	↓ ※造血幹細胞移植7日前より施行後35日まで														
フルコナゾールカプセル	100mg 4Cp	内服	分1	↓ ※好中球数が1000を超えて1週間まで														

備考：ブスルフェクス抗癌薬を使用する（例：ベンゾジアゼピン系、フェニトイン、バルプロ酸、レベチラセタム）。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		Epcoritamab-1							更新日	2024/4/18									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	8	15	22	28										
エプキンリ皮下注 生理食塩液		0.16mg 20mL	皮下注射		↓														
エプキンリ皮下注 生理食塩液		0.8mg 20mL	皮下注射			↓													
エプキンリ皮下注		48mg	皮下注射				↓		↓										
プレドニン錠		100mg	内服	朝食後	エプキンリ投与日~4日間														
カロナール錠 レスタミンコーワ錠		500mg 2錠 50mg	内服	投与前	↓	↓	↓	↓											

備考：

レジメン名		Epcoritamab-2~3							更新日	2024/4/18									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	8	15	22	28										
エプキンリ皮下注		48mg	皮下注射		↓	↓	↓	↓											

備考：前回投与でGrade2又は3のサイトカイン放出症候群があらわれた場合、エプキンリ投与日~4日間プレドニン錠100mg内服。

レジメン名		Epcoritamab-4~9							更新日	2024/4/18									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	15	28												
エプキンリ皮下注		48mg	皮下注射		↓	↓													

備考：前回投与でGrade2又は3のサイトカイン放出症候群があらわれた場合、エプキンリ投与日~4日間プレドニン錠100mg内服。

レジメン名		Epcoritamab-10~							更新日	2024/4/18									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	28													
エプキンリ皮下注		48mg	皮下注射		↓														

備考：前回投与でGrade2又は3のサイトカイン放出症候群があらわれた場合、エプキンリ投与日~4日間プレドニン錠100mg内服。